Главными причинами болезней копытец у свиней становятся закрытые или открытые повреждения, недостаточно качественные условия содержания, неполноценный рацион, неправильная постановка конечностей, игнорирование правил ухода за копытцами. Чрезмерное разрастание рога или деформирование копытца приводит к связанности движения, напряженной ходьбе и хромоте.

Особенности болезней копытец

Следует отметить, что у свиней рог растет со скоростью 4 миллиметра в месяц. Для профилактики развития заболеваний в области копытец следует выполнять расчистку и обрезку. При этом в больше степени следует обращать внимание на задние копытца.

Одной из распространенных болезней является флегмона венчика. Здесь подразумевается воспаление клетчатки, находящейся под кожей венчика. Заболевание сопровождается хромотой пораженной конечности, возникновением припухлостей на межкопытной и передней поверхности, которая нависает в виде манжета над венечным краем стенки копыта. Животное ведет себя вяло, угнетенно.

Чтобы вылечить флегмону, нужно обеспечить свинье покой, обильную и мягкую подстилку. Также можно использовать новокаин с антибиотиками. На пораженную область накладывают спиртовые повязки до выделения гноя.

Причины заболеваний

Среди главных причин заболеваний копытец у поросят и взрослых свиней можно назвать неправильное содержание, отсутствие ухода, несбалансированное кормление. Излишнее разрастание копытец или их деформирование приводит к связанности движений, напряженности, хромоте.

Пододерматит

Под пододерматитом подразумевают воспаление основы кожи копытца. Данное заболевание бывает асептическим. Оно появляется при наминах, во время перегона свиней по щебенчатому грунту, при ушибах в подошвенной области, на стенках копыта из-за долговременного стояния животных. В случае попадания анаэробной инфекции может развиться заболевание пододерматит с выделением гноя.

При асептической форме заболевания животное хромает, у него наблюдается скованная походка с выгнутой спиной, увеличение температуры тела или только пораженной конечности. В области венчика наблюдается опухоль. Если свинья более гнойной формой данной патологии, копытце будет слишком горячим, а при его исследовании с помощью щипцов наблюдаются сильные боли, отслоение подошвы или роговой каймы, смягченный хрящ или некроз мякиша.

Животному, пораженному данным заболеванием, необходимо обеспечить удобную мягкую подстилку. В вену свинье вводится новокаин в виде 0,25-процентного раствора. В течение первых дней область копытца должна получать воздействие холода, а на четвертые сутки проводятся тепловые манипуляции. При наличии раны выполняется обработка 10-процентным йдоформным эфиром, фурацилиновым раствором, на рану нужно наложить повязку с разными мазями и антисептическими порошками. Во время

смены