



Молодые телята всегда более восприимчивы к воздействию внешних факторов и вирусов, чем взрослые особи. По этой причине болезни телят могут нанести огромный ущерб скотоводству. В развитии болезней новорожденных детенышей и более старших телят наблюдается несколько факторов:

- Специфические инфекции, вирусы и прочие возбудители;
- Неправильный уход;
- Неподобающие условия содержания;
- Недостаточное или некачественное питание.

Сократить процент заболеваемости и увеличить эффективность выращивания телят можно только, используя комплексные меры.

Причины болезней телят и их лечение

Самым важным и распространенным фактором развития патологий новорожденных телят является неполноценное питание для стельных коров. В этом случае обычно питание дается несбалансированное, состоящее из непитательных ингредиентов, содержащее пропавшие продукты. Особенное внимание нужно обратить на рацион питания в течение последних месяцев вынашивания телят. В этот период вес детеныша увеличивается на семьдесят процентов, протекают завершающие стадии развития органов и систем.

Организм материнской коровы в это время слишком активно расходует собственные запасы для обеспечения питания теленка, но зачастую этого не хватает. Поэтому может родиться слабый детеныш. Если его масса составляет менее 30 килограмм, то вероятность его заболеваемости составит 55 процентов. А если вес детеныша составил 20 килограмм, то он заболит с 98-процентной вероятностью.

Болезни новорожденных телят и их лечение

Массовая заболеваемость телят связана обычно с нарушениями содержания и кормления – особенно важно пересмотреть рацион детенышей, держать под контролем микроклимат и чистоту в телятнике.

Большую роль играет соблюдение санитарных и ветеринарных норм при родовой деятельности коровы. Если животному не обработать пупочный канатик, то может развиваться сепсис и омфалофлебит. Также нередко могут быть нанесены травмы во время прохождения родовых путей. После появления на свет теленка особенно важно ему очистить носовые проходы, растереть тело с помощью жгута из соломы, а при потребности сделать внешний массаж сердца.

Главным инструментом защиты детенышей в первые недели жизни является их первичный иммунитет, заключающийся в антителах, содержащихся в молозиве коровы. Молозиво телятам нужно дать не позже чем через два часа после того, как они появились на свет. Если с этим затянуть, то заболеваемость детенышей возрастет на 40 процентов. И еще один важный нюанс – четко спланированный и грамотно составленный рацион питания. Подача корма на сутки делится на пять приемов. А молозиво телятам дают только в индивидуальных бутылках с сосками.