



Тем, кто собирается разводить кролей, необходимо помнить, что длинные уши этим зверькам служат не только украшением, а жизненно необходимым органом. В длинных ушах расположено большое число кровеносных сосудов, за счет которых обеспечивается терморегуляция тела кроля. Крупные скопления кровеносных сосудов являются приманкой для кровососущих насекомых и паразитов, возбуждающих различные заболевания.

Болезнь псороптоз

Многие заводчики отлично знакомы с этим заболеванием. Его также называют ушной чесоткой – это паразитарная болезнь ушей кролей. Ее возбудителями являются мелкие клещи рода *Psoroptes*, которые паразитируют в области слухового прохода и внутри ушной поверхности. Как многие паразиты, данные клещи сосут кровь своих жертв. В местах укусов участок кожи начинает воспаляться. Первые признаки болезни появляются на пятый день после поражения. Сильное беспокойство зверька сложно не заметить – кроль начинает часто бить лапами по ушам, чешет их, трясет головой, трется ею о клеточные прутья.

Чтобы развеять последние сомнения, можно взять соскоб с зараженной ушной раковины. Его необходимо отправить в теплое вазелиновое масло, а после этого рассмотреть под увеличительным стеклом. В соскобе у больного кролика будут отличны

видны двигающиеся паразиты. Чтобы избавиться от клеща, необходимо воспользоваться специальным средством в виде аэрозоля – оно продается в зоомагазинах.

Если заболевание имеет легкую форму, развитие воспаления будет похоже на экзему. Пузырьки, появляющиеся после укусов клеща, уже скоро начнут лопаться. Жидкость, вытекающая из них, высыхает, и появляются корки. Для тяжелой формы характерно слияние большого количества очагов поражения. Корочки внутри уха при отхождении могут стать причиной закупорки слухового прохода. Несвоевременная диагностика заболевания может стать причиной осложнений. Воспаление через уши может поразить мозг кролика, и лечение уже станет бессмысленным.

Гнойный отит

Следующая болезнь ушей у кролей – это гнойный отит. Им могут поражаться внутренние части уха. Гной во время отита появляется за барабанной перепонкой, куда проникли паразиты и бактерии. Инфекция может распространиться и на внешнее ухо, и вглубь по проходу.

Данное заболевание не имеет характерной симптоматики, поэтому нередко его можно спутать с псороптозом. В любом случае заболевший кролик будет трясти головой и чесать уши лапами, отказываться от питания, будет вялым и угнетенным. Когда барабанная перепонка разорвется, во внешнем ухе появится выделение гноя. Когда инфекция начнет углубляться, вы заметите атаксию – зверек будет совершать движения по кругу, падать, наталкиваться на разные предметы. Его голова все время наклонена в одну сторону, глаза «бегают» произвольно.

При первых же симптомах и подозрениях на болезнь важно сразу обратиться к врачу, поскольку необходимо определить разновидность инфекции и получить советы по поводу лечения кролика.