



Для кроликов характерна высокая плодовитость. Это можно объяснить тем, что процесс овуляции у самок кролей происходит не в конкретные дни цикла, а именно во время спаривания, что дает практически стопроцентную гарантию зачатия. Кролиководам нужно с повышенным вниманием подойти к вопросу выявления беременности. Поскольку в это время у крольчихи меняются привычки, поведение, характер. Есть ряд специальных методов, которые дают возможность понять сукрольность крольчихи.

Как узнать, что самка беременна?

Определить факт наличия беременности у кролей неопытным разводчикам будет сложно. Но в этом вам поможет анализ поведения животных. Нередко у беременной крольчихи меняется поведение. Если раньше она была резвой, активной, то при сукрольности она будет спокойной, тихой, чрезмерно пугливой, начнет стягивать все, что попадает под руки, на одну кучу. Таким образом, она формирует гнездо. Помимо этого, крольчиха начинает скатывать со своего брюшка пушок, укладывает его в гнездо. По отношению к самцу она становится более агрессивной, не подпускает к себе никого.

При сукрольности крольчиха может даже укусить хозяина. Важно запомнить, что именно гнездование считается самым верным и точным признаком зачатия у крольчихи. Иногда самки начинают выстраивать гнезда за четыре дня до окрола. А некоторые это делают прямо в тот день, когда собираются рожать. У самок во время беременности меняются пристрастия в еде, они начинают много кушать и пить, очень быстро набирают вес. Однако при выявлении сукрольности по массе необходимо учитывать только точные цифры, сравнивать текущие показатели массы тела крольчихи с массой до случки. Как правило, в течение первых семи дней беременности она набирает примерно 30 граммов. А в конце второй недели около 60 граммов. В течение следующих двух недель кардинально меняется ее масса, и она становится округлой.

Приблизительно спустя неделю после спаривания живот самки начинает получать маленькую округлость. Однако это не всегда можно заметить, поскольку слой пуха на ее теле очень плотный. Ближе к родам живот уже будет напоминать мячик, при этом крольчиха крайне тяжело перемещается, большую часть времени проводит в лежачем положении.

Пальпация крольчихи

Успешно определить беременность можно с помощью пальпации. Этот метод нужно применять только опытным фермерам, чтобы не травмировать случайно крольчат. Если опыта разведения кролей мало, тогда лучше всего попросить помощи у профессионалов. Крольчиху нужно развернуть к себе лицом, взять за спинку левой рукой. Второй рукой очень осторожно прощупать низ животика. При беременности будут нащупываться плоды, маленькие крольчата размером с абрикосу. Если удалось нащупать маленькие шарики, ни в коем случае на них нельзя давить, жать, так как кролики от этого могут пострадать.

Бывает и ложная беременность, когда случилось спаривание, а зачатие не произошло. Иногда такие крольчихи могут проявлять поведение беременных.