Как правило, коз разводят для получения молока, поскольку оно очень полезное и питательное. Конечно, если в молоке попадается посторонняя примесь, его качество существенно уменьшается, и при этом падает прибыльность. Одной из частых проблем является кровь в молоке. Давайте узнаем, почему это происходит и как предупредить заболевания.

Основные причины

Присутствие следов крови в молоке обусловлено заболеваниями вымени или механическим повреждением этого органа. Наиболее частая причина – это мастит вымени, представляющий собой инфекционный воспалительный процесс молочной железы. Как правило, он протекает без ярких симптомов, отчего этот недуг становится особо опасным, ведь заподозрить болезнь сразу довольно трудно. Сигналом о возникновении проблемы может стать окрашивание молока в розовый оттенок.

Помимо того, что при мастите молоко содержит следы крови, также наблюдаются другие признаки болезни: уменьшается удой, быстро киснет молоко, сложно выдоить

козу, вымя отекшее. Температура этого органа выше, чем температура других частей тела, при ощупывании чувствуются уплотнения, у животного нет аппетита, в молоке присутствуют сгустки, хлопья и слизь.

Возбудителями мастита считаются соответствующие стрептококковые бактерии. Однако не только они вызывают заболевание. Коза может заболеть после простуды из-за частых сквозняков, холода в хлеву, сырости. К этому приводят ненадлежащие условия содержания: антисанитария в хлеву, сырая подстилка, нарушения способа доения. Также болезнь вызывают механические травмы вымени, повреждение сосков, болезни половой системы, нарушение сроков деторождения.

Как лечить коз?

В первую очередь больную козу нужно изолировать от стада, чтобы болезнь не получила массовое распространение. Обеспечьте животному самые лучшие условия содержания: чистое помещение, теплоту, отсутствие сквозняков. Смена подстилки и уборка хлева выполняется регулярно. Исключите из рациона комбикорма и сочные корма. Давайте теплое питье в необходимом количестве. Обычно применяются такие способы лечения, как курс антибиотиков уколов, новокаин. Народные методы помогут, только если болезнь находится на ранней стадии развития. К примеру, используется мазь календулы, ихтиоловая мазь, растирки. Помните, что схему и способ медикаментозной терапии должен установить ветеринарный врач, после тщательной диагностики и проведения лабораторных анализов.

Застой молока в вымени

Зачастую застойным процессам подвержены молодые козы, которые рожают впервые. Это может стать следствие нарушения обращения лимфы и крови в молочной железе на последней стадии беременности. Застой проявляется увеличением органа, отсутствием болевых ощущений при пальпации. Вымя напоминает на ощупь тесто. Если животное содержат в сырости и холоде, то при частом доении может появляться отек вымени, застаивается молоко, отчего травмируется молочная железа, важно следить за этим.