



Врачи еще не нашли специфического способа лечения против возбудителя катаральной лихорадки злокачественного типа. Поэтому терапевтическая тактика в основном направлена на борьбу с симптомами и поддержание пострадавших систем и органов. При возникновении симптомов заболевшее животное нужно срочно изолировать от других особей.

Содержание больного скота

Помещение, где будет содержаться больная корова, не должно иметь яркого освещения, поскольку часто у животного появляется светобоязнь. Больные особи обычно отказываются от принятия пищи, но все-таки следует обеспечить им наличие легкой, мягкой и сочной еды. Обязательно давать обильное питье с небольшим количеством кислоты.

Для облегчения симптомов применяются холодные компрессы на голову, позволяющие снизить температуру. Чтобы поддерживать сердечную деятельность в мышцы коровы вводится кофеин. Под влиянием вируса на слизистых оболочках и коже появляются

язвы и эрозии. Язвы заражаются инфекцией, и развивается вторичное бактериальное заражение.

Какие лекарства дают животным?

Животным нужно обязательно давать антибиотики. Зачастую используются макролиды и препараты ряда цефалоспоринов.

Для лечения вторичных инфекционных поражений применяется драксин, кламоксил, тетрацилин, оксид.

Чтобы предупредить отек легких и мозга, коровам вводится в вену раствор хлористого кальция – в объеме примерно 200 грамм. Заболевание нередко сопровождается долговременной диареей. Чтобы побороть обезвоживание организма в вену вводится физраствор в количестве пять литров. Объем вводимой жидкости зависит от того, насколько много воды потеряла корова, а также долговременности диареи и способности особи употреблять жидкость самостоятельно.

Носовую и ротовую полость пораженных коров можно промывать марганцевокислым калием для дезинфекции. Мешки конъюнктивы промываются однопроцентной борной кислотой.

Иногда ветеринары советуют как можно раньше начать алкогольно-глюкозную терапию. Для этого особям дается крепкий алкоголь (40 градусов) по половине литра в течение четырех дней. Также предусмотрена схема вливания алкоголя внутривенно. Для этого готовится смесь из 200 миллилитров спирта, 25 грамм глюкозы и 300 миллилитров физраствора. Данный состав вводится в вену коровы каждые 12 часов. Терапия состоит из четырех инъекций.

Если в поголовье скота были обнаружены больные коровы, то вывоз их из хозяйства для производственных мероприятий запрещается. Также запрещено употреблять сырое молоко от коров, которые находятся в стаде, где были выявлены больные особи с

катаральной лихорадкой. Карантин длится в течение двух месяцев после смерти или выздоровления больных коров.

Профилактика

Специальных профилактических мер не разработано. У особей, переболевших данным заболеванием, не формируется устойчивый иммунитет, следовательно, они могут заболеть вторично. Обычно повторное заболевание протекает более тяжело и заканчивается гибелью.