



Повальные выкидыши нередко наблюдаются у крупного рогатого скота, например, у коров, лошадей. В редких случаях это случается со свиньями и козами. Хозяйственное значение выкидыши имеют у коров и кобыл. Эта проблема временно приводит к сокращению прибыльности молочного хозяйства и коневодства при большом распространении.

### Почему у животных случаются выкидыши

Причиной данной патологии являются грибки – микроорганизмы, которые заметны только при микроскопическом увеличении. У рогатого скота данные грибки одни, а у лошадей другие. Да и пути проникновения их в организм животных отличаются. Инфекционное начало выделяется из зараженного животного через половые органы, молоко или мочу. Заражение может случиться и половым способом, либо через предметы, которые находились в соприкосновении с указанными пораженными выделениями инфицированного животного. Кобылы нередко заражаются заболеваниями при употреблении некачественного корма.

Хозяин скота должен следить за состоянием животных, проверять их в ветеринарных лечебницах, брать анализы для лабораторного исследования, чтобы определить, заболело ли животное, и есть ли риск повального выкидыша.

Важно исследовать кровь беременной коровы и кобылы, а также во время покупки новых животных. Если коровы заразились инфекциями или грибками, то у них возможен выкидыш на 7 месяце вынашивания, а у кобыл в период с 8 по 9 месяц.

### **Признаки повального выкидыша**

О повальном выкидыше идет речь, когда своих телят или жеребят теряет одновременно несколько животных в одном хозяйстве. Выкидыш случается у всех животных в указанные сроки. При этом во время рассматривания оболочек скинутого плода выявляется, что они имеют патогенный желтый налет, который по виду напоминает кукурузную кашу. После таких выкидышей у коров и кобыл задерживается послед.

Непосредственно выкидыш происходит с легкостью без особых потуг, а если хозяин не является наблюдательным человеком, он может найти в хлеву скинутый мертвый плод, что станет для него неожиданностью. У животных после выкидыша часто наблюдается грязное гнойное выделение из детородных органов. Истечение длится в течение двух недель. Данное заболевание, присутствующее в фермерском хозяйстве, держится на протяжении нескольких лет. Только со временем инфекция ослабевает и может вызвать бесплодие у большого количества особей.

### **Лечение повального выкидыша**

Медикаментозное лечение повального выкидыша приносит немного пользы. Для предупреждения поражения животных ветеринары делают прививки кобылам и коровам. Кроме этого рекомендуется после каждой случки проводить тщательное орошение половых органов жеребцов и быков, используя слабый раствор лизоля. Беременным животным с 6 месяца вынашивания каждый день нужно мыть половые органы и хвост, используя этот раствор. Хозяевам после соприкосновения с животными после выкидыша нужно соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки и обувь, меняя верхнюю одежду.

