



Сибирская язва свиней – это заразное быстро протекающее заболевание разных видов животных, в том числе пушных зверьков и человека. Для нее характерно резкое увеличение температуры тела, появление плотных опухолей в кишечной системе, на коже, миндалинах и легких.

### **Как протекает заболевание?**

Патологию вызывает микроб палочковидного типа, обладающий особой устойчивостью к действию средств дезинфекции. Во время кипячения он погибает через час, в однопроцентном растворе формальдегида или десятипроцентном растворе натра он может умереть за два часа. Микроб, попадая в почву, формирует споры, которые сохраняются в ней в течение десятков лет.

Животные заражаются намного чаще через питание или на пастбище, если в еду из почвы попадают споры микроба. Человек может заразиться во время разделки туш или при вскрытии умерших животных, страдавших сибирской язвой. Это заболевание может протекать остро, мгновенно или хронически.

Если течение молниеносное, то свинья становится возбужденной, ее температура увеличивается до 43 градусов, отчего животное погибает в приступе судорог. В случае острого течения наблюдается высокая температура тела, синеют слизистые глаз, дрожь, кровоизлияние. При этом у свиньи развивается ангина, воспаляются миндалины, лимфоузлы глотки и гортани.

Воспаление в горле сопровождается отеком шеи. В этом случае дыхание и глотание затрудняются, усиливается кашель, сопение. Заболевание длится до трех дней.

Хроническая болезнь у свиней с сибирской язвой сопровождается отеками, потерей веса, опуханием заглочных и подчелюстных лимфатических узлов. Часто сибирская язва протекает в карбункулезной форме при подостром и остром течении. В этом случае на месте проникновения возбудителя и в прочих частях тела возникают заметные патологические отеки кожи, а затем в центре отеков появляются язвочки.

Труп животного, зараженного сибирской язвой, раздувается, нет окоченения, изо рта, заднего прохода и ноздрей выделяется кровь темного цвета. На языке, трахеях, в области гортани прощупываются студенистые инфильтраты. На коже появляются припухлости.

В случае подозрения на сибирскую язву необходимо срочно связаться с ветеринарным доктором. Трупы вскрывать самостоятельно запрещено, даже если болезнь не подтвердилась.

### **Лечение сибирской язвы**

Терапия может осуществляться только ветеринарным доктором, с использованием внутримышечной инъекции сыворотки и антибиотиков.

В качестве основы для профилактики должна стать ежегодная вакцинация свиней

против данного заболевания. Прививать нужно только тех животных, которые находятся на лагерном или свободновыгульном содержании. У тех свиней, которые уже переболели язвой, вырабатывается долговременный и устойчивый иммунитет.